

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 3 - 6 - 69 935072

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE,
LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

25 F.

Supplément N° 4 au Bulletin Technique N° 104 de Mai 1969

1969-15

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Mildiou : De nouvelles taches ont été découvertes dans la plupart des vignobles de la région. Elles sont encore peu nombreuses, mais les foyers risquent de s'étendre en particulier dans les vignes non traitées à la fin de la semaine dernière.

En raison des pluies abondantes et prolongées, il serait utile de renouveler la protection dès que possible.

Black-Rot : Les pluies du 7 au 9 mai ont provoqué des contaminations dont les taches, souvent nombreuses, viennent d'apparaître.

Le traitement conseillé ci-dessus contre le Mildiou évitera l'extension de la maladie dans la zone habituellement atteinte.

Tordeuses de la grappe (Eudémis-Cochylis) : Le traitement préconisé dans notre précédent bulletin a été délavé par les dernières pluies dans de nombreux vignobles. Toutefois, il n'est indispensable de le renouveler que dans les foyers particulièrement infestés les années précédentes.

INFORMATIONS

Oïdium : Dès le retour du beau temps effectuer un traitement contre l'Oïdium dont l'évolution progresse.

Phylloxéra gallicole : Dans les vignobles d'hybrides où apparaissent les premières galles, traiter par pulvérisation dès réception du présent avis, avec une spécialité commerciale à base de Lindane en émulsion à 30 grs de matière active par Hl. ou de Mévinphos à la même dose.

Erinose : L'Erinose ne se manifeste avec acuité que dans quelques rares cas, très localisés. Effectuer des poudrages répétés de soufre pour freiner la virulence de l'acarien. Ce procédé n'assure cependant que des résultats partiels et temporaires.

.../...

P342

.../...

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Les pluies du début de mai sont responsables de l'importante apparition des taches, notamment sur les Pommiers.

Pour éviter de nouvelles contaminations, renouveler le dernier traitement préconisé par notre dernier bulletin.

Cochenille du Mûrier sur Pêcher : Les ^{éclosions des}jeunes larves sont importantes depuis quelques jours dans la région de Port-Ste-Marie, Aiguillon, Buzet-sur-Baise.

Appliquer dans les prochains jours une pulvérisation soignée d'Oléoparathion (0,6% de produit commercial par Hl. d'eau) dans les vergers de Pêchers où des encroûtements de Cochenilles ont été constatés sur les troncs et les branches principales au cours de l'hiver précédent.

INFORMATIONS

Rouille du Prunier - Carpocapse des Prunes : Effectuer un traitement mixte, les précédentes applications n'assurant plus une protection suffisante à la suite des pluies.

Bactériose du Noyer : On assiste actuellement au début du dessèchement des stigmates dont la chute est prochaine. Par ailleurs, la végétation se développe rapidement et les précipitations abondantes ont délavé les produits de traitements.

En conséquence, une nouvelle application cuprique devient nécessaire dès que possible.

POMMES DE TERRE

Mildiou : Un traitement contre le Mildiou devrait être appliqué à présent dans toutes les cultures de Pommes de terre.

Bordeaux, le 29 mai 1969

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU